

## FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y ZINC.

VECA PLUS ZINC ayudará a mantener la integridad de las membranas celulares de las plantas y mejora su tolerancia al estrés ambiental, favoreciendo la polinización y la cuaja. Contiene extracto de algas, cuyos ingredientes activos se potencian en la mezcla para estimular procesos celulares claves. Este producto mejora la absorción y transporte de nutrientes, incrementa el poder antioxidante de la planta y contribuye a un crecimiento equilibrado y saludable. VECA PLUS ZINC es esencial para la síntesis de proteínas, formación de clorofila, regulación de hormonas, metabolismo de carbohidratos, y síntesis de ácidos nucleicos.

### APLICACIÓN

FOLIAR

#### Composición

p/v

Macrocystis Pyrifera

20,0%

Zinc (Zn)

10,0%

# AV

SOLUCIONES SIN ESTRÉS

## BENEFICIOS

### Formatos



- Corrector de deficiencias de Zinc
- Precursor de aminoácido Triptófano, que ayudan en la formación de Auxinas.
- Favorece la viabilidad y fertilidad del grano de polen.
- Constituyente estructural y funcional de muchas enzimas.
- Clave para la captación y suministro del carbono atmosférico a los cloroplastos.
- Participa en el metabolismo de los carbohidratos, ayudando en la conversión de azúcares en almidón.
- Mantiene la integridad de las membranas celulares, otorgando mayor estabilidad a los tejidos, evitando estrés oxidativo.



## FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y ZINC.

La deficiencia de zinc se manifiesta principalmente en el amarillamiento intervenal de las hojas jóvenes, el reducido tamaño de las hojas y el acortamiento de los entrenudos, lo que da como resultado un crecimiento compacto. Detectar estos síntomas temprano permite aplicar correctivos para evitar mayores daños en la floración, el desarrollo de frutos y el rendimiento general de la planta.

### RECOMENDACIÓN DE USO

### DOSIS L/HA

<b>FRUTALES PERSISTENTES</b>	Aplicar en los flujos de crecimiento de otoño-primavera y repetir según necesidad de cultivo.	2-3 L
<b>FRUTALES CADUCOS</b>	Primera aplicación en botón floral. Segunda aplicación fruto cuajado, repetir cada 2 a 3 semanas hasta un mes antes de cosecha, Aplicar post cosecha antes de inicio de senescencia de hoja.	2-3 L
<b>UVA DE MESA, VINÍFERA, PISQUERA Y KIWIS</b>	Aplicar 20 días antes del inicio de flor y repetir a los 15 días.	2-3 L
<b>BERRIES</b>	Aplicar de 1 a 2 veces, preferentemente antes de floración.	2 L
<b>HORTALIZAS</b>	Estados tempranos de desarrollo, con cubrimiento adecuado.	2-3 L
<b>CEREALES Y LEGUMBRES</b>	Aplicación a los 25-30 días post-emergencia, repetir según requerimiento del cultivo. Se recomienda una aplicación después de floración para mejorar calidad de grano y rendimiento.	2-2,5 L

Para dudas o consultas contactar al encargado de su zona AgroVeca o con el departamento técnico de AGROVECA SPA  
[www.agroveca.cl](http://www.agroveca.cl)  
[www.agroveca.com.pe](http://www.agroveca.com.pe)  
 Formulado por AGROVECA SpA. Germán Riesco 302 Of. 305 - Rancagua, Sexta Región. contacto@agroveca.cl

