

FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y POTASIO.

VECA PLUS POTASIO está especialmente recomendado para todo tipo de cultivos con bajo vigor, poco calibre, falta de color, regula acidez, favorece la formación y traslocación de carbohidratos (azúcares). VECA PLUS POTASIO contiene extracto de algas cuyos ingredientes activos se potencian en la mezcla para estimular procesos celulares claves, ayudando a la planta a una mejor absorción, transporte de nutrientes, aumentando su poder antioxidante y resistencia a estrés ambiental, mejora almacenamiento de la fruta en frío, y aumenta la turgencia de las hojas y ayuda a una mejor eficiencia fotosintética.

APLICACIÓN

FOLIAR

Composición

p/v

Macrocystis Pyrifera

20,0%

Potasio (K₂O)

25,0%



SOLUCIONES SIN ESTRÉS

BENEFICIOS

Formatos



- Fuente directa de Potasio.
- Favorece la economía de agua ya que regula la apertura y cierre de estomas, favoreciendo la turgencia de los tejidos.
- Ayuda al movimiento de azúcares al fruto favoreciendo color, sabor y crecimiento celular.
- Aumenta tolerancia a variaciones térmicas abruptas.
- El Potasio es cofactor de mas de 40 enzimas, relacionadas al metabolismo de los carbohidratos.

FERTILIZANTE/BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y POTASIO.

Las deficiencias de potasio se observan como amarillamiento en los bordes de las hojas, especialmente las más viejas. Los bordes amarillentos se vuelven marrones y mueren. Plantas con tallos delgados y menor desarrollo. Mayor susceptibilidad a sequía, plagas y enfermedades. Frutos más pequeños y de menor calidad. Menor rigidez, tallos que se doblan fácilmente. Curvatura hacia abajo en las hojas y aparición de manchas que luego se necrosan.

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS L/HA

FRUTALES

4-8 tratamientos cada 15 días, primera aplicación después de cuaja, hasta completar 20-40 L/ha/ciclo.

4-6 L

BERRIES

Aplicar desde inicio de quiebre de color. Repetir cada 10 días hasta llegar a cosecha.

4-6 L

CUCURBITÁCEAS

Durante crecimiento de fruto repitiendo cada 14 días.

2-3 L

UVA DE MESA, VINÍFERA Y PISQUERA

Aplicar en la última fase del cultivo, inicio de pinta y repetir 10 días después.

4-6 L

SOLANÁCEAS

Primera aplicación 45 días antes de cosecha. Segunda aplicación 30 días antes de cosecha. Tercera aplicación 15 días antes de cosecha.

4-6 L

PRADERAS

Junto a fitosanitarios.

2-3 L